



# PLURIGIN<sup>®</sup>

## 10 VAGINAL OVULES

### Thành phần:

Một viên chứa: Collagen thủy phân, Chiết xuất glycolic từ cỏ đuôi ngựa (*Equisetum arvense*), Polyhexamethylenbiguanide (PHMB), Acid Lactic, Glycerin, Nước tinh khiết.

### Phân loại

Thiết bị y tế dùng cho đường âm đạo

### Chỉ định

Điều trị hỗ trợ các bệnh viêm, teo của niêm mạc âm đạo, như viêm cổ tử cung và viêm lộ tuyến cổ tử cung. Đối với tác động dưỡng ẩm, viên đặt Plurigin được chỉ định sau khi vật lý trị liệu (DTC, Liệu pháp laser, Liệu pháp lạnh) hoặc trong trường hợp khô âm đạo trong thời kỳ hậu mãn kinh, cũng như khi có hiện tượng chảy máu. Viên đặt Plurigin, nhờ vào hàm lượng gelatin (collagen thủy phân) và chiết xuất cỏ đuôi ngựa, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chữa lành và tái biểu mô, trong khi axit lactic, PHMB cho phép phục hồi pH sinh lý vùng âm đạo bằng cách chống lại sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.

### Hướng dẫn sử dụng

Đặt 1 viên vào buổi tối. Lấy một viên đặt từ vị, tách hai mép của vị, lấy viên ra và đưa viên sâu vào âm đạo.

### Khuyến cáo

Tất cả các thao tác nói trên phải được thực hiện một cách nhẹ nhàng để tránh vỡ viên. Sản phẩm có thể bị chảy khi tiếp xúc với nguồn nhiệt nhưng không làm mất các đặc tính của sản phẩm, tuy nhiên, khuyến cáo nên bảo quản viên trong tủ lạnh trong thời gian cần thiết để đạt được độ rắn chắc mong muốn.

### Cảnh báo

Sản phẩm chỉ được dùng qua đường âm đạo. Trong các thử nghiệm lâm sàng, sản phẩm đã được chứng minh là không kích ứng. Trong trường hợp xảy ra tác dụng phụ thì phải dừng việc sử dụng sản phẩm và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Polyhexamethylenbiguanide (PHMB) là một chất gây dị ứng do tiếp xúc hiếm gặp, với tỷ lệ mắc phải là 0,5% trong tổng số mẫu người được thử nghiệm một cách ngẫu nhiên. Dừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức nếu nhận thấy có phản ứng viêm da dị ứng do tiếp xúc và cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

### Tránh xa tầm tay trẻ em.

Không sử dụng sản phẩm sau ngày hết hạn. Bảo quản sản phẩm tránh xa các nguồn nhiệt, ở nhiệt độ dưới 25°C. Sau khi sử dụng không vứt bỏ vị ra ngoài môi trường.

### Chống chỉ định

Mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm. Phụ nữ mang thai hoặc sử dụng sản phẩm trong thời gian dài phải được thực hiện dưới sự giám sát của bác sĩ. Không sử dụng sản phẩm nếu mẫn cảm với polyhexamethylenbiguanide hoặc các chất tương tự khác.

### Tác dụng phụ

Không có tác dụng phụ nào được biết đến.

**Quy cách:** 10 viên x 2,9g

### Nhà sản xuất

PRAEVENIO Pharma s.r.l.  
Via Paolo Rivero, 172/174  
81031 Aversa (CE)

Ngày sửa đổi cuối cùng của văn bản: 30/10/2018

CE 0373